



Fieberkrämpfe

= Dazu kann es bei Kindern zwischen 6 Monaten und 6 Jahren kommen, wenn sie Fieber haben. Fieberkrämpfe sehen bedrohlich aus, sind jedoch grundsätzlich nicht gefährlich!

Symptome

- Das Kind verdreht die Augen
- Bewusstlosigkeit
- Gesichtsfarbe blau oder blass
- Der Körper erschlafft oder versteift sich
- Die Arme und Beine machen rhythmische Zuckungen



Behandlung

- Bleiben Sie ruhig
- Keinesfalls sollten Sie ihr Kind schütteln, den Kiefer mit Gewalt öffnen oder mit Wasser bespritzen
- Sorgen Sie für eine sichere Umgebung
- Lagern Sie das Kind seitlich
- Schauen Sie auf die Uhr, um die Dauer des Fieberkrampfes einzuschätzen
- Wenn der Fieberkrampf länger als 5min dauert, verabreichen Sie Diazepam Rektien in den After (Diazepam 5mg <20kg, Diazepam 10mg >20kg), wenn bereits durch den Arzt verordnet
- Hört der Anfall nach weiteren 10min nicht auf, rufen Sie den Notarzt (Tel.: 144)
- Messen Sie das Fieber und versuchen Sie dies zu senken. **Wichtig:** Nichts in den Mund geben, solange das Kind bewusstlos ist! Verabreichen Sie Paracetamol wie z.B. Ben-u-ron, Tylenol und Dafalgan

Prozedere

- Wenn es der ERSTE Fieberkrampf ist, dann melden Sie sich sofort beim Arzt!
- Wenn es nicht der erste Fieberkrampf war und der Allgemeinzustand Ihres Kindes gut ist, melden Sie sich innerhalb einiger Stunden beim Arzt.