

kleiner Pieks – grosse Wirkung

Impfplan 2023

adaptiert nach Bundesamt für Gesundheit*



Alter	Basis-Impfungen								Ergänzende Impfungen					
	Diphtherie	Tetanus ¹	Pertussis ²	Polio ³	Hib ⁴	Hepatitis B	Pneumokokken PCV13 ⁵	Masern, Mumps, Röteln	Varizellen ⁶	HPV Mädchen ⁷	Grippe	Meningokokken ACWY ⁸	HPV Jungen ⁷	Herpes Zoster ⁹
2 Monate	●	●	●	●	●	● ^b	●							
4 Monate	●	●	●	●	●	● ^b	●							
9 Monate								●	● ^e					
12 Monate	●	●	●	●	●	● ^b	●	●	● ^e					
24 Monate					a		a	c	e			●		
4–7 Jahre	●	●	●	●	a		a	c	e			a		
11–14/15 Jahre	●	●	●	d		● ^b	●	c	e	● ^h		● ⁱ	● ^h	
25 Jahre	● ^{f,g}	● ^{f,g}	● ^g	d		b		c	e	h	j		h	
45 Jahre	● ^{f,g}	● ^{f,g}	g	d		b		c			j			
Ab 65 Jahren	● ^{f,g}	● ^{f,g}	g	d		b					● ^j			● ^k

Kennzeichnet Einzel- oder Kombinationsimpfstoffe



¹ Tetanus = Starkkrampf; ² Pertussis = Keuchhusten; ³ Polio = Kinderlähmung; ⁴ Hib = *Haemophilus influenzae* Typ B; ⁵ PCV13: Pneumokokken, 13 Serotypen; ⁶ Varizellen = Windpocken/Wilde Blatten/Spitze Blatten; ⁷ HPV = Humane Papillomaviren; ⁸ Meningokokken der Serogruppen A, C, W und Y; ⁹ Herpes Zoster = Gürtelrose

^a Nachholimpfung bis 5. Geburtstag;

^b Die Hepatitis B-Impfung wird bevorzugt für Säuglinge mit einem Kombinationsimpfstoff empfohlen. Die Hepatitis B-Impfung wird weiterhin für bisher nicht geimpfte Jugendliche im Alter von 11–15 Jahren empfohlen. Nachholimpfung in jedem Alter möglich (bei Expositionsrisiko).

^c Nachholimpfung für alle nicht geimpften nach 1963 geborenen Personen;

^d Nachholimpfung;

^e Impfung bzw. Nachholimpfung für Varizellen für alle Personen unter 40 Jahren, welche die Varizellen nicht durchgemacht haben;

^f Auffrischimpfungen sind mit 25 (dTpa), 45 (dT) und 65 (dT) Jahren und danach alle 10 Jahre (dT) empfohlen. Kürzere Intervalle können je nach Risikosituation indiziert sein;

^g Auffrischimpfung mit 25 Jahren; schwangere Frauen (jede Schwangerschaft)**; Kontakt mit Säuglingen < 6 Monaten**;

^h Im Alter von 11–14 Jahren als Basisimpfung (Mädchen) und ergänzende Impfung (Jungen). Nachholimpfungen bis 26 Jahre gemäss Schweizerischem Impfplan;

ⁱ Nachholimpfung bis zum 20. Geburtstag;

^j Schwangere Frauen (jede Schwangerschaft während Grippesaison)**; ab 65 Jahren (jährlich) als Basis-impfung;

^k Für immunkompetente Personen im Alter von ≥ 65 Jahren mit 2 Dosen (Zeitpunkte 0 und 2 Monate) mit dem adjuvantierten Subunit-Impfstoff.

* Vereinfachte Darstellung der Angaben aus: Bundesamt für Gesundheit (BAG), Eidgenössische Kommission für Impffragen (EKIF) Schweizerischer Impfplan 2023, 1–46. Richtlinien und Empfehlungen. Bern: Bundesamt für Gesundheit, 2023.

** Empfohlene Impfung der Kategorie Risikogruppen/Risikosituationen gemäss BAG Impfplan 2023. Für weitere Impfempfehlungen dieser Kategorie sowie weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Ärztin/Ihren Arzt oder Ihre Apothekerin/Ihren Apotheker.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Ärztin / Ihren Arzt
oder Ihre Apothekerin / Ihren Apotheker.

GlaxoSmithKline AG, Talstrasse 3, CH-3053 Münchenbuchsee

© 2023 GSK group of companies or its licensor.