




## Schädelhirntrauma (Hirnerschütterung)

= Entsteht durch Stürze auf den Kopf, gewaltsame Schläge oder heftiges Schütteln.



### Melden Sie sich bei uns, wenn Ihr Kind...

- Bewusstlos war
- Über Übelkeit klagt oder erbricht
- Verschieden grosse Pupillen hat
- Starke Kopfschmerzen hat
- Schwindel hat
- Nicht mehr sich selbst ist (verändertes Verhalten, verwirrt)
- Sich nicht an den Unfallhergang erinnern kann
- Aus mehr als 1m Höhe fiel (Säuglinge jede Sturzhöhe) oder einen starken Schlag gegen den Kopf erhalten hat

### Behandlung

- Schmerzen: Paracetamol wie z.B. Ben-u-ron, Tylenol und Dafalgan
- Verabreichen Sie Ihrem Kind leichte Kost
- 24h keine Bildschirmtätigkeit, körperliche Schonung

### 24h-Überwachung zu Hause nach Arztkonsultation (bis der Unfall 24h her ist)

- Kontrollieren Sie tagsüber alle 2 Stunden die Pupillen (Schwarzes in der Mitte des Auges): Diese müssen gleich gross sein
- Falls der Unfall in der ersten Tageshälfte passiert ist: Wecken Sie Ihr Kind um 0.00 Uhr und überprüfen Sie die Pupillen und das Verhalten Ihres Kindes
- Falls der Unfall in der zweiten Tageshälfte passiert ist: Wecken Sie Ihr Kind um 22.00 und 02.00 Uhr und überprüfen Sie die Pupillen und das Verhalten Ihres Kindes
- Melden Sie sich wieder bei uns oder direkt auf der Notfallstation, wenn Ihr Kind erbricht, unterschiedliche Pupillengrössen aufweist oder sich im Verhalten verändert